

KEUZEKAART Ik ben bevallen en wil een voorbehoedmiddel dat mij goed beschermt tegen zwangerschap

Je bent bevallen en je wilt nu niet zwanger worden. Misschien in de toekomst wel. Je zoekt een voorbehoedmiddel dat goed beschermt tegen zwangerschap*. Je kunt in de keuzekaart kijken wat het beste bij jou past. De arts of verloskundige kan je helpen bij je keuze. Geef je borstvoeding? Borstvoeding geven helpt om zwangerschap te voorkomen, tot maximaal 6 maanden. Ongeveer 20 van de 1000 vrouwen worden daarbij tóch zwanger. Die kans is nog groter als je minder borstvoeding, of flesvoeding gaat geven. Of als je weer ongesteld bent geworden. Wil je meer zekerheid? Kies dan een voorbehoedmiddel dat goed beschermt tegen zwangerschap. Ook als je borstvoeding geeft, kun je daar al mee beginnen.

Behandel mogelijkheden →	Koperspiraal	Hormoonspiraal	Hormoonstaafje	Prikpil	Minipil	De (gewone) pil
Kans dat je toch zwanger wordt?	Minder dan 5 van de 1000 vrouwen per jaar (als er nooit wat misgaat).					
Zitten er hormonen in?	Geen hormonen	1 soort hormoon: progesterone			2 soorten hormonen: oestrogeen en progesterone	
Wat moet jij of de arts doen?	Arts of verloskundige plaatst de spiraal in je baarmoeder, via je vagina. Werkt 5 of 10 jaar (dat hangt af van het type spiraal). Arts haalt het eruit als je een nieuwe nodig hebt of hiermee wilt stoppen.	Arts of verloskundige plaatst de spiraal in je baarmoeder, via je vagina. Werkt 5 jaar. Arts haalt het eruit als je een nieuwe nodig hebt of hiermee wilt stoppen.	Arts of verloskundige plaatst het staafje onder de huid van je bovenarm. Werkt 3 jaar. Arts haalt het eruit als je een nieuwe nodig hebt of hiermee wilt stoppen.	Arts geeft de prik elke 12 weken. Of je prikt jezelf elke 13 weken. Werkt 12 of 13 weken.	Elke dag rond dezelfde tijd slikken. Geen stopweek.	Elke dag rond dezelfde tijd slikken. Na 3 weken een stopweek. Je kunt ook doorslikken om niet ongesteld te worden.
Invloed op je borstvoeding?	Nee					Je kunt minder borstvoeding aanmaken. Geef dan vaker de borst als je kind erom vraagt.
Invloed op je baby?	Nee, er komt geen hormoon in je borstvoeding.	Nee, er komt geen of bijna geen hormoon in je borstvoeding.				
Invloed op je ongesteldheid?	Je wordt gewoon ongesteld. Kans op meer en langer pijn en bloedverlies als je ongesteld bent, vooral de eerste 3 maanden.	Vaak word je helemaal niet meer ongesteld. Als je wel ongesteld wordt is het bloedverlies minder. Soms heb je onregelmatig een beetje bloedverlies.	De eerste maanden kan je onregelmatig ongesteld zijn. Daarna verdwijnt je ongesteldheid of hou je onregelmatig een beetje bloedverlies.		Je weet precies wanneer je ongesteld wordt. Het bloedverlies is minder en duurt korter. Vaak ook minder pijn. Je kan je ongesteldheid uitstellen.	
Invloed op hoe je je voelt?	Geen invloed op hoe je je voelt door hormonen.	De meeste vrouwen voelen zich niet anders. Vooral de eerste 3 maanden: kleine kans op lichte somberheid of minder zin in seks. Het is niet zeker of deze dingen komen door het voorbehoedmiddel.				
Wat zijn andere bijwerkingen en nadelen?	Het plaatsen kan pijn doen. Kleine kans dat er iets misgaat bij het plaatsen: het spiraaltje valt eruit. Of het spiraaltje gaat door de wand van de baarmoeder heen.***	Vooral de eerste 3 maanden kleine kans op: hoofdpijn, acne, haaruitval, pijn in je borsten. Meer afscheiding uit je vagina. Het plaatsen kan pijn doen. Kleine kans dat er iets misgaat bij het plaatsen: het spiraaltje valt eruit. Of het spiraaltje gaat door de wand van de baarmoeder heen.*** Mogelijk iets meer kans op borstkanker.	Staaftje blij je voelen onder je huid. Soms moeilijk weer weg te halen.	Je kunt zwaarder worden. Na stoppen pas na 6 tot 12 maanden weer ongesteld. Als je jonger dan 18 bent: mogelijk zwakkere botten. Mogelijk iets meer kans op trombose.	Vooral de eerste 3 maanden: kleine kans op hoofdpijn, pijn in je borsten, zwaarder worden. Iets meer kans op trombose**, borstkanker en hart- en vaatziekten.	
Hoe snel na de bevalling mee beginnen?	Na 6 weken. Beslis met je arts of verloskundige of je wacht tot de borstvoeding is gestopt. De kans dat de spiraal door de wand van de baarmoeder heen gaat is dan kleiner.***	Borstvoeding: na 4 weken. Geen borstvoeding: na 3 weken.	Borstvoeding: na 6 weken. Geen borstvoeding: na 3 weken.	Na 3 weken.	Borstvoeding: na 6 weken. Geen borstvoeding: na 3 weken.	
Wanneer kun je na stoppen weer zwanger worden?	Meteen			Kan 6 tot 12 maanden duren voordat je weer zwanger kunt worden.	Meteen	

* Voorbehoedmiddelen die minder goed beschermen tegen zwangerschap staan niet in deze keuzekaart_Voorbehoedmiddelen_tegen_zwangerschap_2022 aanpassingen. Dit zijn: condoms, pessarium en geen seks hebben op vruchtbare dagen (periodieke onthouding). Deze staan in de [keuzetabel voorbehoedmiddelen zonder hormonen](#).

** Kies daarom de pillen die de minste kans geven op trombose. [Kijk hier welke pillen dat zijn](#). Andere pillen geven extra kans op trombose. De [hormoonring](#) en de [hormoonpleister](#) geven mogelijk ook extra kans op trombose.

*** Kans dat de spiraal door de wand van de baarmoeder heen gaat: bij borstvoeding bij 6 op de 1000 vrouwen; bij geen borstvoeding bij 1 op de 1000 vrouwen.

Kijk in de [keuzekaart Voorbehoedmiddelen tegen zwangerschap 2022 aanpassingen Ik wil een voorbehoedmiddel dat mij goed beschermt tegen zwangerschap](#) om andere dingen te vergelijken zoals Wanneer is het minder of niet geschikt?