

KEUZekaart Regelmatig ontstoken keelamandelen bij kinderen (<16 jaar)

Keelamandelen verwijderen of afwachten?

Heeft uw kind regelmatig last van ontstekingen van de keelamandelen en is uw kind jonger dan 16 jaar? Deze keuzekaart kan u, uw kind en uw KNO-arts helpen om de keuze tussen keelamandelen verwijderen en afwachten te bespreken. Deze keuzekaart is niet bedoeld voor andere klachten, zoals snurken met ademstops (obstructieve slaapapneu).

Let op! Vaak is het niet helemaal zeker of een ontsteking van de keelamandelen alle keelpijn veroorzaakt. Het is dus niet altijd zeker of het verwijderen van de keelamandelen tegen de klachten helpt.

BEHANDELMOGELIJKHEDEN →	Keelamandelen verwijderen	Afwachten
Hoe werkt deze behandeling?	<ul style="list-style-type: none"> Uw kind gaat onder narcose. De KNO-arts verwijdert de keelamandelen. Bij jonge kinderen verwijdert de KNO-arts vaak ook de neusamandel. De operatie duurt ongeveer tien minuten. Hoe lang de ingreep precies duurt, hangt af van de leeftijd van het kind en de manier waarop de arts de amandelen verwijdert. Uw kind mag vaak dezelfde dag nog naar huis. 	<ul style="list-style-type: none"> U wacht af of de klachten vanzelf minder worden. Blijken de klachten toch te ernstig om af te wachten? Dan kunt u er alsnog voor kiezen om de keelamandelen te verwijderen.
Vermindert deze behandeling de klachten van mijn kind?	<p>Veel kinderen hebben na de behandeling minder ontstekingen. Ook zijn de ontstekingen minder ernstig. Hoe meer ontstekingen uw kind voor de operatie had, hoe meer resultaat u van de behandeling kunt verwachten.</p> <p>Uw kind kan wel nog steeds keelpijn krijgen. Dit komt dan door een andere oorzaak dan een ontsteking van de keelamandelen.</p>	Een ontsteking van de keelamandelen gaat meestal vanzelf weer over. Bij veel kinderen keert de ontsteking na een tijdje weer terug, maar soms ook niet.
Doet deze behandeling pijn?	Uw kind is tijdens de operatie onder narcose en heeft dan geen pijn. Na de operatie heeft uw kind vaak wel pijn. Deze pijn kunnen we goed behandelen met pijnstillers.	Zijn de keelamandelen van uw kind opnieuw ontstoken? Dan kan uw kind hierdoor pijn hebben. Deze pijn kunnen we goed behandelen met pijnstillers. Soms zijn antibiotica nodig.
Wat zijn mogelijke bijwerkingen van deze behandeling?	<ul style="list-style-type: none"> Na de operatie zal uw kind zich misschien niet lekker voelen en een tijdje keelpijn hebben. Er is een kleine kans dat uw kind klachten krijgt door de narcose, zoals misselijkheid, braken en/of koorts. 	Krijgt uw kind antibiotica? Dan kan uw kind last krijgen van bijwerkingen, zoals diarree of een allergische reactie.
Wat zijn de risico's van deze behandeling?	Het belangrijkste risico is een nabloeding. Dit betekent dat het wondje in de keel van uw kind gaat bloeden. 5 tot 21 van de 1000 kinderen (0,5–2,1%) krijgt een nabloeding. We moeten uw kind dan opnieuw opnemen en soms opnieuw opereren.	De ontsteking van de keelamandelen kan terugkeren. Er is ook een heel kleine kans dat uw kind in de toekomst een abces krijgt rondom de keelamandelen. Een abces doet veel pijn. Uw kind kan dan moeilijk slikken en voelt zich ziek.