

KEUZekaART Vocht in het middenoor bij kinderen

Buisje in het trommelvlies of niet?

Heeft je kind last van vocht in het middenoor (slijmoor)? Deze keuzekaart helpt jou, je kind en je keel-neus-oor-arts om samen te kiezen voor wel of geen [buisje in het trommelvlies](#).

Let op: je kind kan pas een buisje in het trommelvlies krijgen als het door het vocht in het oor minder goed kan horen. Ook moet 1 van deze dingen kloppen:

1. Je kind heeft er veel last van dat het niet goed hoort. Dit betekent dat je kind moeite heeft met dagelijkse dingen, zoals school, sport en spelen.
2. Je kind is jonger dan 4 jaar en heeft problemen met taal en praten. Dat komt misschien door het vocht in het oor.

Behandelkeuzes →	Geen buisje in het trommelvlies, wel controles	Buisje in het trommelvlies
Hoe werkt het?	• Je wacht af tot je kind vanzelf beter gaat horen. • Als je kind niet vanzelf beter gaat horen, ga je na 3 maanden met je kind naar de arts. Die kijkt in het oor van je kind. En controleert hoe goed je kind hoort.	• Je kind wordt voor de operatie met medicijnen in slaap gebracht (narcose). • De keel-neus-oor-arts plaatst een buisje in het trommelvlies. • De operatie duurt ongeveer 10 minuten. • Je kind mag dezelfde dag naar huis.
Wat is het resultaat?	• Je kind gaat meestal steeds een beetje beter horen. Bij de helft van de kinderen gaat het binnen 3 maanden beter. Bij 3 van de 4 kinderen gaat het binnen 6 maanden beter. Soms duurt het langer dan een jaar. Of het vocht in het oor komt steeds terug. • Duurt dit te lang? Bespreek dan met je arts of je kind alsnog trommelvliesbuisjes kan krijgen. • Zolang er vocht in het middenoor zit, kan je kind een beetje oorpijn hebben.	• Je kind hoort bijna altijd meteen beter. • Je kind blijft ongeveer 6 tot 9 maanden beter horen. • Daarna kan je kind soms weer minder goed gaan horen. De keel-neus-oor-arts kan dan nog een keer een buisje in het trommelvlies plaatsen. • Heeft je kind problemen met praten en gedrag? Het is niet zeker of die minder worden door buisjes. • Je kind heeft waarschijnlijk minder vaak oorpijn.
Doet het pijn?	Nee	• Je kind wordt voor de operatie met medicijnen in slaap gebracht (narcose). Daardoor merkt je kind niets van de operatie en heeft het geen pijn. • Heeft je kind pijn na de operatie? Dan krijgt het pijnstillers.
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?	• Slecht horen kan ervoor zorgen dat leren praten langer duurt. • De meeste kinderen praten weer even goed als andere kinderen als ze op de basisschool zitten.	• Er is een kleine kans dat je kind klachten krijgt door de narcose, zoals misselijk zijn, overgeven of koorts. • Ongeveer de helft van de kinderen krijgt een loopoor na de operatie. Bij een loopoor kan er ook bloed uit het oor komen. • Een loopoor is goed te behandelen met oordruppels. • Als je kind op zwemles zit, is de kans op een loopoor misschien groter. • Bij 3 van de 100 kinderen groeit het gaatje in het trommelvlies niet dicht nadat het buisje eruit is. • Heeft je kind hier last van? Dan kan de arts het gaatje later dichtmaken met een operatie. • Door een buisje kan je kind littekentjes op het trommelvlies krijgen. • Door deze littekentjes en het gaatje hoort je kind soms iets minder goed. Dit kan ook gebeuren als je kind geen buisjes krijgt en vaak oorontsteking heeft.
Wat is de kans dat de klachten terugkomen?	Hoe jonger je kind is, hoe groter de kans dat de klachten terugkomen.	De meeste buisjes vallen vanzelf uit. Dit kan na 6 maanden zijn en ook nog na 1 jaar. Je kind kan dan weer minder goed gaan horen. Hoe jonger je kind is, hoe groter die kans is.