

KEUZekaART Relapsing remitting multiple sclerose (RRMS)

Welke medicijnen zijn er?

Ga je beginnen met medicijnen tegen relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) of clinically isolated syndrome (CIS)? Meestal kun je dan kiezen uit de medicijnen op deze keuzekaart. Je bespreekt dit met een arts die veel weet over MS en CIS (neuroloog).

MEDICIJNEN →	Fumaraat-esters (dimethylfumaraat, diroximelfumaraat)	Glatirameer	Interferon-βeta	S1P receptor modulatoren (fingolimod, ozanimod, ponesimod)	Teriflunomide
Hoe gebruik je het?	Je slikt 2 keer per dag een pil.	Je geeft jezelf een prik. De arts vertelt je hoe vaak.	Je geeft jezelf een prik. De arts vertelt je hoe vaak.	Je slikt 1 keer per dag een pil.	Je slikt 1 keer per dag een pil.
Waar moet je op letten?	Je laat 2, 3 of 4 keer per jaar bloed prikken.		Je laat 1 keer per jaar bloed prikken.	Je laat 2 keer per jaar bloed prikken. In het begin vaker. De arts vertelt je hoe vaak.	Je laat 2 keer per jaar bloed prikken. In het begin vaker. De arts vertelt je hoe vaak.
Wat zijn de voordelen van dit medicijn?	Je hebt de helft minder kans op nieuwe MS-aanvallen.	Je hebt een derde minder kans op nieuwe MS-aanvallen.	Je hebt een derde minder kans op nieuwe MS-aanvallen.	Je hebt ongeveer de helft minder kans op nieuwe MS-aanvallen.	Je hebt een derde minder kans op nieuwe MS-aanvallen.
Wat zijn de nadelen van dit medicijn?	<ul style="list-style-type: none"> • Je kunt last krijgen van diarree, een opgeblazen gevoel, buikpijn en misselijk zijn. • Na het slikken van de pil kun je gaan blozen. Dit kan een paar minuten tot een paar uur duren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je moet de prikken soms in de koelkast bewaren. • Je huid kan pijn doen, jeuken of indeuken op de prikplek. • Na de prik kun je het opeens heel warm krijgen. Of je hart kan snel gaan kloppen. Dit duurt maar kort. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sommige merken van dit medicijn kun je niet lang buiten de koelkast bewaren. • Je kunt je na de prik een paar uur grieperig voelen. • Je huid kan pijn doen op de prikplek. Een lichte huid kan ook rood worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Na de eerste pil kan je hart wat langzamer gaan kloppen. Dit gaat binnen een paar uur vanzelf over. • Je kunt vocht achter je netvlies krijgen. • Je kunt huid-afwijkingen krijgen. • Sommige mensen kunnen hoofdpijn of diarree krijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De eerste 6 maanden dat je dit medicijn gebruikt, kan je haar dunner worden. Bij ongeveer 9 van de 10 mensen gaat dit vanzelf weer over. • Je kunt last krijgen van je maag of darmen.
Kun je het krijgen als je zwanger wilt worden of zwanger bent?	<p>Wil je zwanger worden of ben je zwanger, vertel dit dan aan je arts.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je moet stoppen met dit medicijn als je zwanger bent. • Bespreek met de arts of het nodig is om een ander medicijn te gaan gebruiken. 	Je kunt dit medicijn gebruiken.	Je kunt dit medicijn gebruiken.	<ul style="list-style-type: none"> • Je moet met dit medicijn stoppen als je zwanger wilt worden of zwanger bent. • Bespreek met de arts of het nodig is om een ander medicijn te gaan gebruiken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je moet met dit medicijn stoppen als je zwanger wilt worden of zwanger bent. • Bespreek met de arts of het nodig is om een ander medicijn te gaan gebruiken.
Mag je autorijden?	Je mag met alle medicijnen autorijden. Het kan wel zijn dat je door de MS-klachten niet mag autorijden.				

Twijfel je of je met medicijnen wilt beginnen? Gebruik dan de keuzekaart 'RRMS: Beginnen met medicijnen of afwachten'

Deze keuzekaart is gemaakt met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en is te vinden op [THUISARTS.NL](https://thuisarts.nl)