

Voor wie? Je hebt diabetes type 2 en gebruikt al metformine. Je gebruikt ook 1 of 2 andere medicijnen. Toch blijft je bloedsuiker (HbA1c) te hoog.

Hoe gebruiken? Deze keuzekaart kun je gebruiken om te kiezen welk medicijn je erbij gaat slikken. Je doet dit altijd samen met je huisarts of praktijkondersteuner. Zij weten welke medicijnen je in jouw situatie kunt gebruiken.

Gezond leven blijft heel belangrijk, welk medicijn je ook kiest. Kijk op [Thuisarts](#) en praat erover met je zorgverlener.

Medicijn →	Gliclazide	SGLT2-remmer (zoals empagliflozine)	GLP1-agonist (zoals semaglutide)	DPP4-remmer (zoals sitagliptine)	Insuline
Hoe gebruik je het?	Je slikt 1 of 2 keer per dag een pil.	Je slikt 1 keer per dag een pil.	Je geeft jezelf 1 keer per dag of 1 keer per week een prik.	Je slikt 1 keer per dag een pil.	Je geeft jezelf 1 keer per dag een prik.
Hoeveel kan je HbA1c dalen?	Je HbA1c kan 11 tot 22 punten dalen.	Je HbA1c kan 7 tot 9 punten dalen.	Je HbA1c kan 11 tot 20 punten dalen.	Je HbA1c kan 7 tot 9 punten dalen.	Je HbA1c kan 18 punten of meer dalen.
Verandert je gewicht?	De meeste mensen worden ongeveer 2 kilo zwaarder.	De meeste mensen vallen ongeveer 2 kilo af.	De meeste mensen vallen ongeveer 3 kilo af.	De meeste mensen worden ongeveer een halve kilo zwaarder.	De meeste mensen worden ongeveer 2,5 kilo zwaarder.
Bijwerkingen	Er is een kleine kans dat je 1 of meer hypo's krijgt.	Vooral bij ouderen: duizeligheid, droge mond, vaak plassen, moeilijk of niet kunnen poepen. 1 van de 10 mensen krijgt een ontsteking door een schimmel aan de vagina, schaamlippen of penis.	Veel mensen hebben in het begin last van misselijkheid, overgeven en diarree. De huid kan rood worden of je kunt uitslag krijgen op de plek waar je prikt.		Er is een kans dat je 1 of meer hypo's krijgt. De plek waar je prikt kan dik en rood worden en pijn doen.
Zeldzame, ernstige bijwerkingen		Neem dit medicijn niet als je koorts of diarree hebt, moet overgeven of weinig eet. Als je deze pil dan wel slikt, is er een kleine kans dat je ernstig ziek wordt door verzuring van het lichaam. Er is een heel kleine kans op: <ul style="list-style-type: none"> • slecht genezende wondjes aan de voeten • zeer ernstige ontsteking van schaamlippen of balzak 	Kleine kans op ontsteking van de galblaas en van de alvleesklier.	Kleine kans op ernstig hartfalen, ontsteking van de alvleesklier en nieren die opeens niet goed meer werken.	
Meer info	Medicijnen worden meestal vergoed uit de basisverzekering. Je betaalt wel de eigen bijdrage. Vraag bij je eigen zorgverzekeraar of kijk op www.dvn.nl .				